

Drug Information

Drug Information

Adverse Drug Reaction
Adverse Drug Reaction

Medication Error
Medication Error

آهن تزریقی (Ferrovin)

با توجه به سوالات متعدد در خصوص لزوم محافظت از نور داروی آهن تزریقی به اطلاع همکاران محترم می‌رساند که:

۱. آهن تزریقی موجود در مرکز (فریک هیدروکساید سوکروز کمپلکس) با نام تجاری **Ferrovin** بصورت آمپول ۵ میلی لیتری حاوی ۱۰۰ میلی گرم آهن عرضه می‌گردد.
۲. این دارو حساس به نور نبوده و بمنظور آماده سازی و تزریق، شرایط محافظت از نور ضروری نمی‌باشد.
۳. جهت رقیق سازی فقط از سرم نمکی (نرمال سالین) استفاده شود. با توجه به احتمال زیاد ناسازگاری با سایر داروها، آهن تزریقی با داروهای دیگر ترکیب/مخلوط نشود. برای رقیق سازی دارو از ۱۰۰ میلی لیتر نرمال سالین استفاده شود. حتما جهت بررسی احتمال بروز واکنش دارویی حاد، ۲۵ میلی لیتر اول طی حداقل ۱۵ دقیقه انفوزیون شده، و مابقی محلول طی ۳۰ دقیقه انفوزیون شود. این دارو را می‌توان در اواسط زمان همودایلز از کاتتر وریدی استفاده کرد.
۴. اگر رقیق سازی دارو در شرایط آسپتیک و در اتاق تمیز (Clean Room) در داروخانه انجام شود، دارو تا ۱۲ ساعت بعد قابل نگهداری و استفاده می‌باشد. ولی چنانچه رقیق سازی دارو توسط پرستار و در بخش انجام شود، بدلیل جلوگیری از رشد میکروبی دارو حداکثر تا ۳ ساعت بعد قابل نگهداری و استفاده می‌باشد.
۵. با توجه به احتمال بروز واکنش شدید آلرژیک، در زمان تجویز دارو باید شرایط و امکانات انجام احیا قلبی - ریوی فراهم باشد.
۶. حتما قبل از رقیق سازی و تزریق به دقت آمپول را از نظر وجود ذره و رسوب بررسی نمایید. در صورت مشاهده ذره و رسوب از مصرف دارو خودداری نمایید.
۷. با توجه به اینکه دارو شدیداً قلیایی می‌باشد از تزریق IM یا SC دارو جدا خودداری نمایید.

دکتر ناصر هداوند

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته و خطاهای دارویی

بخش خدمات و مراقبت‌های دارویی - مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

از همکاران محترم تقاضا می‌شود در صورت مشاهده وقوع هر گونه عارضه یا اشتباه دارویی، اشکالات ظاهری داروها (تغییر رنگ، وجود ذره یا رسوب) و مشاهده داروهای تاریخ گذشته مراتب را از طریق تکمیل و ارسال فرم زرد و یا تماس تلفنی با شماره داخلی ۲۲۵۱ گزارش نمایند.